

# สารบัญ

หน้า

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีไขสันหลังบาดเจ็บระดับ C4-C5 : กรณีตัวอย่าง	๑
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อกระดูกและใส่แก้วตาเทียม : กรณีตัวอย่าง	๑๗
การพยาบาลผู้ป่วยที่เป็น Toxic Multinodular Goiter : กรณีตัวอย่าง	๒๕
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดี และถุงน้ำดีอักเสบอย่างเฉียบพลัน : กรณีตัวอย่าง	๔๑
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะอาหารและได้รับการผ่าตัด กระเพาะอาหาร : กรณีตัวอย่าง	๖๗
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้ใหญ่อักเสบจากการขาดเลือดและเยื่อ ช่องท้องอักเสบ : กรณีตัวอย่าง	๘๙
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีนิ้วหัวแม่มือชาขาดจากอุบัติเหตุ : กรณีตัวอย่าง	๑๐๑
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดขาขวาได้เข้า : กรณีตัวอย่าง	๑๑๕
การพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโรค Thromboangitis Obliterans : กรณีตัวอย่าง	๑๓๗